

ویال تزریقی سفتازیدیم ۵، ۱۰، ۲ و ۲

گرم

راهنمائیهای عمومی:

کودکان:

قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمائید:

مننژیت: نوزادان و کودکان از ۱ ماه تا ۱۲ سال:

– در صورت وجود هر گونه سابقه حساسیت به این دارو و

۵۰ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن به

سایر سفالوسپورین ها، پنی سیلین و مشتقات آن و پنی

صورت انفوزیون وریدی هر ۸ ساعت.

سیلامین

نوزادان از بدو تولد تا ۱ ماهگی به صورت

– در صورت بارداری و شیردهی

انفوزیون وریدی ۲۵ تا ۵۰ میلیگرم به ازاء هر

– در صورت مصرف در کودکان

کیلو گرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت.

– در صورت ابتلا به سایر بیماریها مانند سابقه اختلالات

خونریزی دهنده، بیماریهای گوارشی بویژه کولیت، نقص

برای انواع عفونتهای دیگر: نوزادان و کودکان

عملکرد کلیه و کبد و سطوح پائین کارنتین

از ۱ ماه تا ۱۲ سال به صورت انفوزیون وریدی

– در صورت مصرف سایر داروها بخصوص الکل، داروهای

۳۰ تا ۵۰ میلیگرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن

ضد انعقاد خون، هپارین و سایر مهار کننده های تجمع

هر ۸ ساعت.

نوزادان، از بدو تولد تا ۱ ماهگی به صورت

پلاکتی ، پروبسید و یا عوامل ترومبولیتیک

انفوزیون وریدی ۳۰ میلیگرم به ازاء هر کیلو

گرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت.

– دوره درمان را بخصوص در عفونتهای استریتوکوکی

کامل کنید. طریقه مصرف :

– در صورت فراموش کردن یک نوبت تزریق دارو به محض تزریق عضلانی عمیق وانفوزیون آهسته وریدی

به یاد آوردن دارو را تزریق ننماید . اما اگر تقریباً " زمان

طرز تهیه محلول تزریقی :

تزریق دوز بعدی فرار رسیده دوز قبلی را تزریق نکرده و

۱– تزریق عضلانی:

دوز بعدی را نیز دو برابر ننماید.

به ترتیب ۱/۵ و ۳ میلی لیتر آب مقطر استریل

هشدار :

قابل تزریق و یا محلول ۱٪ لیدوکائین به

در صورتیکه چند روز پس از مصرف دارو هیچ بهبودی در

ویالهای ۵۰۰ میلیگرمی و ۱ گرمی سفتازیدیم

علائم بیماری حاصل نشد ، با پزشک

اضافه نمائید .

خود مشورت نمائید.

۲– انفوزیون وریدی :

این دارو ممکن است سبب مثبت شدن کاذب نتیجه تست

ابتدا ۳ یا ۵ میلی لیتر آب مقطر استریل یا

احیای مس برای تعیین مقدار قند ادرار در

محلول سدیم کلراید ۹/۰٪، سدیم لاکتات

بیماران دیابتی شود.

۱/۶مولار ، رینگر لاکتات ، رینگر و یا دکستروز

در صورت بروز اسهال شدید قبل از مصرف هر نوع داروی

۵٪ و یا ۱۰٪ به ویالهای ۵۰۰ میلیگرمی و ۱۰

ضد اسهال با پزشک خود مشورت نماید. برای اسهال میلی لیتر از حلالهای فوق به ویالهای ۱ و ۲ خفیف میتوان از ضد اسهال حاوی کائولین یا آتاپولگیت و گرمی سفتازیدیم اضافه کرده و خوب تکان نه ضد اسهالهای دیگر استفاده نمود. دهید تا کاملاً حل شود سپس با ۵۰ تا ۱۰۰ میلی در صورتیکه اسهال خفیف ادامه پیدا کرد و یا تشدید شد با لیتر از همان محلول رقیق و برای انفوزیون پزشک و یا داروساز خود مشورت نمائید. آماده کنید.

مصرف در بارداری و شیردهی : شرایط نگهداری محلولهای تهیه شده :

این دارو طبق نظر سازمان غذا و دارو (FDA) در زمان محلولهایی که داخل ویال تهیه میگردد بارداری در گروه B قرار دارد و لذا باید قبل از مصرف آن بلافاصله پس از آماده سازی تزریق گردد.

با پزشک متخصص مشورت

توجه :

گردد.

بعد از اضافه کردن محلول رقیق کننده ،

حبابهای گاز ایجاد میشوند که ممکن است نیاز به

مقدار و نحوه مصرف :

خارج کردن حبابها باشد.

بالغین :

عوارض جانبی :

عفونتهای استخوان و مفاصل : به صورت انفوزیون وریدی ۲

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن

گرم هر ۱۲ ساعت.

است باعث بروز برخی عوارض نا خواسته گردد.

عفونتهای شکمی و لگن ، منتزیت و سپتی سمی : به صورت اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده

انفوزیون وریدی ۲ گرم هر ۸ ساعت. نمیشود ولی در صورت بروز هر یک از علائم زیر

با پزشک مشورت نمائید:

پنومونی و عفونتهای پوست و بافت نرم به صورت انفوزیون

وریدی یا تزریق عضلانی ۵۰۰ میلیگرم تا ۱ گرم هر ۸ ساعت ائوزینوفیلی ، واکنشهای حساسیتی ، کاهش

پروترومبین ها ، کولیت پسودو ممبرانوس ،

التهاب ورید ، اریتم مولتی فرم یا سندرم

عفونتهای ریوی در سیستمیک فیبروزیس پسودومونایی : به

استیونس – جانسون ، کاهش شنوایی ، آنمی

صورت انفوزیون وریدی ۳۰ تا ۵۰ میلیگرم به ازاء هر

همولیتیک ناشی از مصرف دارو ، لکوپنی ،

کیلوگرم وزن بدن ، هر ۸ ساعت تا ۶ گرم در روز.

نوتروپنی ، اختلالات عملکرد کلیوی ،

عفونتهای ساده دستگاه ادراری : به صورت انفوزیون وریدی

واکنشهای شبه بیماری سرم ، تشنج ، وجود ذرات

یا تزریق عضلانی ۲۵۰ میلیگرم هر ۱۲ ساعت .

معلق شبه سنگ در صفرا ، آگرانولوسیتوز ، آنمی

آپلاستیک ، خونریزی ، اختلالات عملکرد کبدی

عفونتهای شدید دستگاه ادراری : به صورت انفوزیون

وریدی یا تزریق عضلانی ۵۰۰ میلیگرم هر ۸ تا ۱۲ ساعت .

شامل توقف جریان صفرا ، پان سیتوپنی ، عفونت

شدید ، نفروپاتی سمی و آنژیوادم

برای سایر عفونتهای شدید تا تهدید کننده زندگی بخصوص

در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند:

شرایط نگهداری :

به صوت انفوزیون وریدی ۲ گرم هر ۸ ساعت .

قبل از افزودن حلال، دارو را در دمای کمتر از

۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری

نمائید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری

نمائید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید .

بسته بندی:

ویال های استریل ۵۰۰ میلی گرم، ۱ و ۲ گرمی.

واحد آموزش

بیمارستان امام خمینی فریمان

خرداد ۱۳۹۵

