

ویال تزریقی سفتریاکسون ۵، ۰ و ۱ گرم

راهنمایی عمومی:

یشگیری از ابتلا به عفونت قبل از عمل جراحی :

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید .

سایر عفونها :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :

انفوزیون وریدی یا تزریق عضلانی ۱ تا ۲ گرم هر ۲۴ ساعت یا ۵۰۰ میلی گرم تا ۱ گرم هر ۱۲ ساعت حداکثر تا ۴ گرم در روز

وجود هر نوع حساسیت به پنی سیلینها ، سفالوسپورینها و یا سایر داروها .

مصرف در کودکان :

مننژیت :

وجود هر نوع حساسیت به موارد دیگر از قبیل غذاها ، مواد محافظ و رنگها .

انفوزیون وریدی یا تزریق عضلانی ۱۰۰ میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن ، حداکثر ۴ گرم در روز اول ، سپس ۱۰۰ میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن هر ۲۴ ساعت یا ۵۰ میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت ، حداکثر ۴ گرم در روز به مدت ۷ تا ۱۴ روز .

در صورت محدودیت مصرف سدیم .

در صورت بارداری و شیردهی .

در صورت ابتلا به بیماریهای معده - روده ای (بویژه کولیت) ، نقص عملکرد کبدی و کلیوی .

عفونتهای بافتی و پوستی :

نوزادان مبتلا به هیپربیلی روبینمی .

انفوزیون وریدی یا تزریق عضلانی ۵۰ تا ۷۵ میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن هر ۲۴ ساعت یا ۲۵ تا ۳۷/۵ میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت ، حداکثر ۲ گرم در روز .

در عفونتهای استرپتوکوکی بویژه در مورد عفونتهای ناشی از استرپتوکوک گروه A بتاهمولیتیک درمان تا ۱۰ روز باید ادامه یابد .

عفونتهای گوش میانی :

تزریق عضلانی ۵۰ میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن ، حداکثر تا ۱ گرم بصورت تک دوز .

مصرف سفتریاکسون بعنوان پیشگیری از عفونت قبل ، بعد و حین جراحی باید در عرض ۲۴ ساعت بعد از جراحی قطع

گردد.

سایر عفونتهای شدید :

انفوزیون وریدی یا تزریق عضلانی ۲۵ تا ۳۷/۵ میلی گرم به
ازاء هر کیلو گرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت حداکثر تا ۲ گرم در روز

مصرف در بارداری و شیردهی :

طبق نظر سازمان غذا و دارو این دارو جزء گروه C
قرار دارد ، لذا مصرف آن در دوران بارداری بجز
موارد

انفوزیون وریدی دارو باید بصورت آهسته (طی حداقل ۳۰
دقیقه) انجام شود . تزریق عضلانی بصورت عمیق در عضله انجام
شود . در صورتیکه بیش از ۱ گرم بصورت عضلانی تجویز شود ،
باید بصورت منقسم در چند ناحیه تزریق شود .

ضروری به تشخیص پزشک متخصص توصیه نمی
شود . در دوران شیردهی نیز به دلیل احتمال ایجاد
عوارض

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز
بعضی از عوارض نا خواسته نیز گردد . اگر چه همه این عوارض
در یک فرد دیده نمیشود ، لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با
پزشک مشورت گردد .

سوء بر جنین مصرف آن فقط در صورت تجویز پزشک
متخصص مجاز میباشد .

هشدار :

جهت بهبودی کامل دارو را در زمانهای معین مصرف نموده عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند:
و دوره در مان را کامل کنید .

عوارض شایع :

مدفوع تیره و سیاه رنگ ، درد سینه ، سرفه ، تب ، درد هنگام
ادرار ، کمبود تنفس ، زخم گلو ، لک های سفید روی لب یا در
دهان ، تورم غدد ، خونریزی غیر معمول یا کبودی .

عوارض نادر :

قبل از تجویز این دارو از عدم وجود هرگونه واکنشهای
حساسیتی به پنی سیلینها و سفالوسپورینها و سایر داروها
حتماً اطمینان حاصل نموده و در صورت داشتن سابقه
حساسیت دارویی و ضرورت مصرف این دارو تزریق با
احتیاط و فقط در مراکز درمانی مجهز به لوازم احیاء ،
صورت گیرد .

واکنشهای حساسیت (تب ، خارش پوستی و قرمزی)
گرمیهای شکمی یا معده ، عوارضی چون بی -اشتهایی ، درد
ابی گاستریک ، تهوع و استفراغ ، در صورت مصرف وریدی .

در صورت نیاز به مصرف همزمان سفتریاکسون با داروهایی
مانند وانکومايسين ، فلوکونازول ، پنسیلینها ،
سفالوسپورینها و آمینوگلیکوزیدها باید در دو محل
جداگانه تزریق شوند .

عوارضی که در صورت تداوم نیاز به توجه پزشکی دارند :

عوارض شایع :

از مصرف دارو بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط

پزشک خودداری نمایید .

واکنشهای معده – روده ای (کرامپ شکمی ، اسهال ، تهوع و استفراغ) سر درد ، کاندیدیازیس دهانی یا زخم دهان .

پس از آماده سازی بلافاصله تزریق شود .

عوارض نادر :

طرز تهیه :

سرگیجه ، تب دارویی ، تنگی نفس ، سوء هاضمه ، درد یا زخم معده ، احساس نفخ ، خارش واژن ، خارش پوست و ناحیه تناسلی . در صورت بروز علائم کولیت پسودو ممبران حتی بعد از قطع مصرف دارو ، نیاز به توجه پزشکی وجود دارد و علائم آن شامل ؛ کرامپ معده – شکمی ، نرمی شکم ، اسهال آبکی و شدید که حتی ممکن است خونی شود و تب .

شرایط نگهداری :

قبل از افزودن حلال ، دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه شود . سپس با ۵۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر از همان محلول برای سانتیگراد و دور از نور نگهداری نمایید

دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید .

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید .

منبع . شرکت دارویی لقمان

تزریق عضلانی : ۱/۸ میلی لیتر آب استریل قابل تزریق یا محلول تزریقی لیدوکائین ۱٪ یا محلول سدیم کلراید ۰.۹٪ و یا محلول دکستروز ۵٪ را به محتویات ویال بیفزایید و خوب تکان دهید تا حل شود .

انفوزیون وریدی : ۴/۸ میلی لیتر آب استریل قابل تزریق یا محلول تزریقی لیدوکائین ۱٪ یا محلول سدیم کلراید ۰.۹٪ و یا محلول دکستروز ۵٪ یا ۱۰٪ را به محتویات ویال بیفزایید و خوب تکان دهید تا کاملاً حل شود . سپس با ۵۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر از همان محلول برای سانتیگراد و دور از نور نگهداری نمایید

انفوزیون آماده نمایید .

طریقه مصرف :

تزریق عضلانی و انفوزیون وریدی (طی مدت ۳۰ دقیقه)

مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین میکند ولی دوز مصرفی این دارو به قرار زیر است :

مصرف در بزرگسالان :

تزریق عضلانی ۲۵۰ میلی گرم بصورت تک دوز .

واحد آموزش

بیمارستان امام خمینی فریمان

۱۳۹۵

