

قرص کلاریترومایسین 500 میلی

گرم

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هر نوع حساسیت به

کلاریترومایسین، اریترومایسین و یا سایر ماکرولیدها.

- وجود هر نوع حساسیت به موارد دیگر از

قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگها.

- در صورت حاملگی و شیردهی.

- در صورت مصرف سایر داروها بخصوص

کاربامازپین، دیگوکسین، ریفاپوتین،

ریفامپین، تئوفیلین، وارفارین و زیدوودین.

- در صورت ابتلا به بیماریهایی نظیر اختلال

عملکرد کلیوی شدید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمیشود، اما در صورت بروز هر یک

از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید. عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند:

عفونت، واکنشهای حساسیتی، سمیت و

اختلالات کبدی، کویت پسودوممبران،

ترومبوسیتوپنی، اختلالات شخصیتی و ذهنی

طولانی شدن زمان QT در ریتم قلبی، سندرم

استیونس جانسون، توهم زایی، لکوپنی،

نارسایی کبدی، کاهش قند خون، سرگیجه،

تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، وزوز گوش و

کاهش شنوایی از عوارض نادر و غیر شایع این

دارو میباشد.

عوارضی که در صورت تداوم نیاز به توجه

پزشکی دارند:

تغییرات حس چشایی، سوء هاضمه، نفخ،

اختلالات دستگاه گوارشی (تهوع، استفراغ،

اسهال، درد معده) و سردرد

هشدار:

- از مصرف همزمان این دارو با سیزاپراید یا

پیموزاید خودداری نمایید.

- در صورتیکه چند روز پس از مصرف دارو

شرایط نگهداری:

هیچ بهبودی در روند بیماری حاصل نشد به - دارو را در درجه حرارت کمتر از ۳۰

پزشک مراجعه کنید. درجه سانتیگراد، دور از نور و درون جعبه
- در صورت فراموشی نمودن مصرف یک دوز نگهداری نمایید - دارو را دور از دسترس
، دارو را به محض به یاد آوردن مصرف کنید اطفال قرار دهید.
. اما اگر تقریباً زمان مصرف دوز بعدی رسیده
اشکال دارویی : قرص ۵۰۰ میلی گرمی
است فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو
برابر کردن مقدار دارو در نوبت بعدی
خودداری کنید .

مصرف در حاملگی و شیردهی:
- مصرف این دارو در دوران بارداری و
شیردهی با تشخیص و تجویز پزشک متخصص
توصیه میشود.
مقدار مصرف دارو :
مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین میکند
ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار
زیر است :
بزرگسالان:

- برونشیت مزمن ، درمان عفونتهای
باکتریایی و خیم ایجاد شده توسط هموفیلوس
آنفلوانزا، هموفیلوس

پارا آنفلوانزا، موراکسلا
کاتارالسی، استرپتوکوکوس پنومونی:
1000 - میلی گرم یک بار در روز برای
مدت ۷ روز

پنومونی ایجاد شده توسط هموفیلوس
آنفلوانزا، هموفیلوس پارا آنفلوانزا، موراکسلا
کاتارالسی، سودموناس

پنومونی، کلامیدوفیلا پنومونی، مایکوپلازما
پنومونی:

1000 میلی گرم یک بار در روز برای

مدت ۷ روز

کودکان ۶ ماه به بالا: ۵/۷ میلی گرم برای

هر کیلوگرم وزن بدن تا حداکثر ۵۰۰ میلی

گرم دو بار در روز.

کودکان زیر ۶ ماه: مقدار لازم توسط پزشک

تعیین می شود.

سینوزیت حاد:

1000 میلی گرم یک بار در روز برای مدت

۱۴ روز

منبع. شرکت دارویی لقمان

واحد آموزش

بیمارستان امام خمینی فریمان

خرداد ۱۳۹۵